

人類狂犬病的認知與預防

疾病介紹-狂犬病

- ◆ 狂犬病由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病後，致死率幾乎達100%，但如能在動物咬傷後，及時就醫，接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效的降低發病的風險。
- ◆ 症狀：初期會有焦慮、頭痛、發燒、咬傷部位異樣感、接著出現吞嚥困難、恐水、肌肉麻痺及抽搐等症狀，發病者最終常因呼吸麻痺而死亡。



人類狂犬病的認知與預防

疾病介紹-狂犬病

- ◆ 根據世界衛生組織估計：每年約有55,000死亡病例，其中亞洲約占31,000例死亡，非洲約占24,000例死亡，其中30~50%是幼童。
- ◆ 臺灣自1959年起不再有人的病例，2002年、2012及 2013年各出現一例境外移入病例。
- ◆ 2013年7月國內確認野生動物（鼬獾）感染狂犬病毒之情形，行政院農業委員會於同年7月18日世界動物衛生組織(OIE)將台灣的通報案例於網站公布，並以2012年5月23日接獲發現第一例鼬獾傷亡案例的日期，作為臺灣動物狂犬病疫情的發生日期。台灣目前屬於狂犬病發生地區。

感染途徑

■ 經動物咬傷

患有狂犬病之動物唾液中含有病毒，病毒可經由抓、咬(或經由皮膚傷口、黏膜)而進入人體。

■ 非經動物咬傷

在蝙蝠山洞內吸入病毒顆粒、實驗中吸入霧氣或經患者之角膜移植而受到感染。

■ 人與人之間的直接傳染，至今尚無病例報告。



暴露「後」處理原則—1記、2沖、3送、4觀

1記—保持冷靜，牢記動物特徵

2沖—沖洗傷口

◆立即以肥皂及清水沖洗傷口15分鐘
再以優碘或70%酒精消毒。



3送—儘速送醫評估是否接種疫苗

◆本市目前提供人用狂犬病疫苗接種地點：

小港醫院、聯合醫院、衛生福利部旗山醫院、高雄長庚醫院、桃源區衛生所、那瑪夏區衛生所、杉林區衛生所、茂林區衛生所、田寮區衛生所、阿蓮區衛生所、茄萣區衛生所。

4觀—盡可能將咬人動物繫留觀察至少10天

◆若動物兇性大發，不要冒險捕捉。



疑似狂犬病暴露後免疫球蛋白與疫苗接種對象

表一、疑似狂犬病或麗沙病毒暴露後「免疫球蛋白」接種對象

2016年11月9日起適用

咬傷人物種	接種建議
鼬獾 白鼻心 錢鼠(限臺東市) 蝙蝠 出現明顯特殊異常行爲（如無故主動攻擊……等）之動物，且經中央農政單位判定疑似狂犬病或麗沙病毒	暴露等級爲第二類，該動物(除蝙蝠外)經檢驗鑑定爲陽性，建議接種免疫球蛋白。 如暴露等級爲第三類，建議接種狂犬病免疫球蛋白 遭受蝙蝠抓咬傷或傷口、黏膜接觸其唾液等分泌物，視爲暴露等級第三類。
暴露之定義：遭受動物抓咬傷或皮膚傷口、黏膜接觸其唾液等分泌物。 第二類定義：裸露皮膚的輕微咬傷、沒有流血的小抓傷或擦傷。 第三類定義：傷及真皮層的單一或多處咬傷或抓傷、動物在有破損的皮膚舔舐、黏膜遭動物唾液污染， 包含遭受蝙蝠抓咬傷或傷口、黏膜接觸其唾液等分泌物。	

疑似狂犬病暴露後免疫球蛋白與 疫苗接種對象

表二、疑似狂犬病或麗沙病毒暴露後「疫苗」接種對象

2016年11月9日起適用

暴露動物類別	接種建議※	備註
野生哺乳類動物(含錢鼠、蝙蝠等)	立即就醫並接種疫苗	若經檢驗陰性，可停止接種疫苗
流浪犬貓	立即就醫並接種疫苗	若流浪犬貓觀察10日無症狀，可停止接種疫苗
家犬貓	暫不給予疫苗	若家犬貓觀察10日內出現疑似狂犬病症狀，並經動檢機關高度懷疑，則給予疫苗

※暴露等級為第二類(含)以上，建議接種疫苗。

特殊免疫措施

■ 人用狂犬病免疫球蛋白（HRIG）

咬傷後儘快浸潤於傷口，以中和傷口病毒
若有剩餘再注射到大腿肌肉部位

■ 人用狂犬病疫苗

共需注射**五**劑，第一劑在咬傷後隨即注射
其餘則在第3、7、14和28天時各施打一劑



- 飼養之動物咬了人，要立即限制其行為，幫助傷者就醫，並提供動物的健康資料。請獸醫師評估是否為異常行為。
- 避免接觸或豢養來源不明的野生動物；遇罹病之野生動物，勿以手觸碰及撿拾。

防檢局狂犬病通報專線 0800-761-590



捕犬隊聯絡專線電話

■ 高雄市燕巢區動物收容所(07-6051002)

負責區域(楠梓、大社、岡山、橋頭、燕巢、田寮、阿蓮、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官、旗山、美濃、六龜、內門、杉林、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏)

■ 高雄市動物保護教育園區(07-5519059)

負責區域(鹽埕、鼓山、左營、三民一、三民二、新興、前金、苓雅、前鎮、旗津、小港、鳳山、林園、大寮、大樹、鳥松、仁武)



愛“牠”就要照顧“牠”-動物飼養與管理

- 兒童年紀太小時，盡量不要飼養寵物。
- 不要讓太小的兒童與動物獨處。提醒自己及兒童與動物相處時要保持警覺。教導兒童不要隨意接近陌生動物。親近別人的寵物前，一定要知會主人。
- 對寵物負責：慎選動物種類，健康檢查/**疫苗施打**，教養訓練/社會性培養，生活陪伴等。



如何避免感染狂犬病-遵守二不一要原則

一不：不要接觸、逗弄野生動物

二不：不棄養寵物

一要：每年要帶犬貓及人工飼養食肉目動物施打疫苗。



衛教單張

+ 預防

多警覺

多安心

狂犬病

什麼是 **狂犬病**

1 傳染途徑

99%是藉由動物抓咬傷傳染，病毒隨著動物唾液，透過動物抓、咬的傷口進入人體。

2 潛伏期

通常 1~3 月

長達 1 年

視傷口情況，通常為1~3個月，短不到一週，長可達一年以上。

3 症狀

初期症狀為發熱喉嚨痛等，數天後病患會有興奮、恐懼、麻痺、吞嚥困難、咽喉部肌肉痙攣(恐水症)，發生精神錯亂、抽搐，後期常因呼吸麻痺而死。

2不1要

不要接觸野生動物

不棄養寵物

要每年定期帶犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗。

被咬傷時該怎麼做

1記

保持冷靜記住動物特徵

2沖

以肥皂清水沖洗15分鐘，併用優碘消毒傷口

3送

盡速送醫評估是否打疫苗

4觀

盡可能將咬人動物繫留觀察10天

常見食肉目動物及蝙蝠

以上動物圖片由 林務局、特生中心及臺北市蝙蝠保育學會提供

人用狂犬病疫苗接種對象

若不慎被咬傷，請儘速就醫，經醫師評估，符合建議接種者需接種5劑疫苗(第0天、3天、7天、14天、28天)，傷口嚴重或面積大時由醫師評估增加使用免疫球蛋白。

動物用狂犬病疫苗

相關資訊請查詢
 高雄市動物狂犬病疫苗及防治諮詢專線：(07)746-2368
 高雄市動保處網站
<http://livestock.kcg.gov.tw/>
 防檢局狂犬病通報專線：0800-761-590
 防檢局 <http://www.baphiq.gov.tw/>「狂犬病專區」

高雄市人用狂犬病疫苗接種地點

醫院/衛生所	地址	電話
高雄市立聯合醫院	鼓山區中華一路976號	(07)555-2565
高雄市立小港醫院	小港區山明路482號	(07)803-6783
衛生福利部旗山醫院	旗山區大德里中學校60號	(07)661-5523
高雄長庚紀念醫院	鳥松區大埤路123號	(07)731-7123
桃源區衛生所	桃源區桃源里南進巷188-1號	(07)686-1126
那瑪夏區衛生所	那瑪夏區瑪雅里六鄰平和巷252號	(07)670-1142
杉林區衛生所	杉林區上平里山仙路93巷2號	(07)677-1319
茂林區衛生所	茂林區茂林里8-4號	(07)680-1046
田寮區衛生所	田寮區南安里崗北路32號	(07)636-1504
阿蓮區衛生所	阿蓮區民生路94-1號	(07)631-7141
茄萣區衛生所	茄萣區濱海路二段1號	(07)698-9275

最新人用狂犬病疫苗施打地點請至本局網站查詢

高雄市政府 關心您
 如果對相關疫情或防治措施有任何疑義，可參閱衛生局全球資訊網 <http://khd.kcg.gov.tw/>
 免付費疫情通報專線 1922 (0800-001922) | 或衛生局防疫專線 (07)723-0250 (限)

最新疫情暨防治資訊歡迎參閱
衛生福利部疾病管制署

<http://www.cdc.gov.tw/>

高雄市政府衛生局全球資訊網

<http://khd.kcg.gov.tw/Main.aspx?sn=1087>

