



高雄市政府衛生局統計通報

110 年高雄市主要死因

一、110 年本市死亡 2 萬 3,002 人，標準化死亡率每十萬人口 443.4 人比 109 年增加 15.8 人，惡性腫瘤死亡 6,651 人仍居首位，占比 28.9%。

110 年本市死亡 2 萬 3,002 人，比 109 年 2 萬 1,712 人增加 1,290 人，標準化死亡率每十萬人口 443.4 人增加 15.8 人。110 年前十大死因及其排序均與 109 年相同，前三順位為惡性腫瘤 6,651 人（占 28.9%）居冠，心臟疾病（高血壓性疾病除外）2,220 人（占 9.7%）居次，肺炎 1,740 人（占 7.6%）位居第三。

前十大死因每十萬人口標準化死亡率與上年度相較之下，以惡性腫瘤減少 2.8 人降幅最大，心臟疾病（高血壓性疾病除外）增加 2.4 人增幅最多（詳表 1）。

表 1、110 年高雄市主要死因

順位	死亡原因	死亡人數	粗死亡率	標準化死亡率	人、人/每十萬人口	排名 進退
					標準化死亡率 較上年增減	
	所有死亡原因	23,002	834.8	443.4	15.8	
1	惡性腫瘤	6,651	241.4	128.6	-2.8	
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,220	80.6	41.0	2.4	
3	肺炎	1,740	63.2	29.6	1.2	
4	腦血管疾病	1,603	58.2	29.1	1.3	
5	糖尿病	1,517	55.1	27.1	1.5	
6	高血壓性疾病	1,005	36.5	17.2	1.4	
7	事故傷害	850	30.8	20.6	-0.7	
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	661	24.0	11.7	0.1	
9	慢性下呼吸道疾病	581	21.1	10.0	-0.8	
10	衰老/老邁	561	20.4	8.7	-0.4	

資料來源：衛生福利部統計處

二、以每十萬人口標準化死亡率性別觀點而言，男性以「事故傷害」減少 3.8 人、「肺炎」增加 3.6 人最多；女性則以「惡性腫瘤」減少 6.5 人、「蓄意自我傷害（自殺）」增加 4.7 人最多。

觀察 110 年十大死因順位，男性各項死因名次與 109 年資料無異，而女性「糖尿病」與「肺炎」名次互換，「蓄意自我傷害（自殺）」擠下「慢性下呼吸道疾病」成為第十大死因。標準化死亡率與 109 年



高雄市政府衛生局統計通報

110 年高雄市主要死因

資料相比，男性以「事故傷害」減少 3.8 人、「肺炎」增加 3.6 人最多；女性則以「惡性腫瘤」減少 6.5 人、「蓄意自我傷害（自殺）」增加 4.7 人最多（詳表 2、3）。

表 2、110 年高雄市男性主要死因

順位	死亡原因	死亡人數	粗死亡率	標準化死亡率	人、人/每十萬人口	
					標準化死亡率較上年增減	排名進退
	所有死亡原因	13,629	1003.3	581.3	23.4	
1	惡性腫瘤	4,095	301.4	171.4	1.7	
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,295	95.3	54.2	3.3	
3	肺炎	1,087	80.0	42.0	3.6	
4	腦血管疾病	963	70.9	39.0	2.6	
5	糖尿病	805	59.3	32.4	1.2	
6	事故傷害	567	41.7	29.0	-3.8	
7	高血壓性疾病	518	38.1	20.4	1.9	
8	慢性下呼吸道疾病	402	29.6	15.7	-2.0	
9	慢性肝病及肝硬化	402	29.6	18.8	3.3	
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	339	25.0	13.5	0.6	

資料來源：衛生福利部統計處

表 3、110 年高雄市女性主要死因

順位	死亡原因	死亡人數	粗死亡率	標準化死亡率	人、人/每十萬人口	
					標準化死亡率較上年增減	排名進退
	所有死亡原因	9,373	671.0	322.3	10.1	
1	惡性腫瘤	2,556	183.0	91.8	-6.5	
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	925	66.2	29.1	1.8	
3	糖尿病	712	51.0	22.5	2.5	△1
4	肺炎	653	46.7	19.5	-1.2	▼1
5	腦血管疾病	640	45.8	20.7	0.2	
6	高血壓性疾病	487	34.9	14.4	1.1	
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	322	23.1	10.2	-0.3	
8	衰老/老邁	299	21.4	8.1	-0.4	
9	事故傷害	283	20.3	12.7	2.4	
10	蓄意自我傷害（自殺）	196	14.0	9.9	4.7	△1

資料來源：衛生福利部統計處