



你/妳為什麼要知道 茲卡病毒感染症？

更新日期：2016.09.19

Q. 感染茲卡病毒會有什麼症狀？



- ✓ 感染到茲卡病毒約為3至7天（最長達12天）開始出現**典型症狀**，但約有75%的人無明顯症狀。
- ✓ 孕婦感染有可能**導致胎兒小頭畸形或死亡**。

典型症狀



關節疼痛




發燒

頭痛



斑丘疹



結膜炎




Q. 茲卡病毒如何傳播？



1、主要為蚊子叮咬傳染：

被帶有茲卡病毒的病媒蚊叮咬而感染，臺灣常見病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊。



Q. 茲卡病毒如何傳播？



2、其他傳染途徑有


母子垂直感染



性行為傳染



輸血傳染



Q. 為什麼孕婦需要特別注意？



- ✓ 因為孕婦感染有可能導致胎兒小頭畸形或死亡。
- ✓ 孕婦或正準備懷孕的女性朋友，都是需要高度小心防範的對象唷！



孕婦



計畫
懷孕
婦女

暫緩前往
流行地區

Q. 現在可以去有茲卡病毒 感染症的流行地區嗎？




- ✓ 如果你正在懷孕或準備懷孕，建議暫緩前往。
- ✓ 一般民衆，若必需前往應做好**防蚊措施**。

1




出國前，可先至國內
旅遊醫學門診評估，
並做好防護措施。

3



住在有**紗窗**、
紗門或**空調**的房舍
避免被蚊蟲叮咬。

2



請穿**淺色長袖衣褲**、塗抹
衛福部核可含敵避（DEET）的
防蚊藥劑，做好防蚊措施。

Q. 近期曾前往茲卡流行地區，
返國後該注意些什麼？



預防茲卡請遵循**1**+**6**原則

- ✓ **1**個月內，暫緩捐血
- ✓ **6**個月內，男女不論有無症狀，皆應採取安全性行為，並延後懷孕



返國後**兩週內**如有不適，應**儘速就醫**並告知旅遊史；有任何疑問可撥打免付費防疫專線**1922**（或**0800-001-922**）洽詢。

Q. 孕婦在懷孕期間被茲卡病毒 感染怎麼辦？



- ✓ 懷孕婦女如經確診為茲卡病毒感染症，應每隔3至4週定期進行胎兒超音波檢查，以追蹤胎兒生長情形。



Q. 感染茲卡病毒要怎麼治療？



- ✓ 目前茲卡病毒感染無疫苗可預防、無抗病毒藥物可治療，以症狀治療為主。
- ✓ 如需退燒，請勿使用阿斯匹靈或任何非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)。

