

高雄市政府衛生局所屬衛生所 108 年度護理人員甄選試題

准考證號碼：_____

※(一)考試時間：1.5 小時

(二)本試卷為雙面印刷，試題為單選題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(三)本科目共 80 題，每題 1.25 分，需用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

- 下列何者非長期照顧 2.0 服務的對象？
 - 失能身心障礙者
 - 50 歲以上失能原住民
 - 50 歲以上失智症患者
 - 65 歲以上失能老人
- 國民長期照護需要調查結果發現，失能者平均全家人口數為 4.58 人，是指
 - 平均 4-5 人就要照顧一個失能者
 - 失能人數佔全國 4.58%
 - 失能的人加上他的家人，佔我們全國人口總數的 4.58%
 - 以上皆非
- 長照 2.0 計畫，不只延續了長照 1.0 的在地老化原則與服務內容，還提供了更多元化的服務，下列何項是長照 2.0 新增的服務項目？
 - 復健服務
 - 輔具服務
 - 喘息服務
 - 居家醫療
- 人口老化是世界各國共同面臨的問題，其進程包含高齡化社會、高齡社會與超高齡社會等，台灣已於 107 年邁入高齡社會，是指 65 歲以上的老年人口達到多少以上？
 - 13%
 - 14%
 - 15%
 - 20%
- 行政院於 105 年 12 月核定長照十年計畫 2.0(簡稱長照 2.0)，並自 106 年 1 月起實施長照 2.0，長照 2.0 的目標何者為非？
 - 預防保健、活力老化
 - 減緩失能，促進長者健康福祉，提升老人生活品質
 - 提供多目標社區式支持服務
 - 醫院式臨終安寧照顧，減輕家屬照顧壓力
- 有關處理失智症患者伴隨的精神問題，如憂鬱、焦慮、激動、幻覺、妄想、睡覺週期障礙等，下列何者為非？
 - 可由非藥物治療及藥物治療兩方面著手，而藥物治療應優先於非藥物治療
 - 對照護者提供訓練，使其具有解決干擾行為的技巧，以及熟練使用相關技巧能力
 - 一般優先選擇副作用少的藥物，從低劑量給予
 - 尋找與標定可處理的促發因素，尤其必須尋求是否有未獲滿足的需求，例如疼痛、飢餓、便秘、尿滯留等等
- 近年失智人口攀升，響應世界衛生組織「失智症全球行動計畫」，打造 2025 失智友善台灣，下列何者敘述為非？
 - 台灣在 102 年推動國家失智症防治照護政策綱領 1.0，是全世界第 13 個制定國家級失智症政策的國家
 - 建構家庭照顧者服務支持網絡：設置失智症諮詢關懷專線、提供照顧訓練課程、家屬支持團體、喘息服務等
 - 目前國內失智症人口已達七成確診率且接受適當治療
 - 推廣失智友善社會運動，教育從小朋友做起
- 下列何者非長期照護的未來主要發展趨勢？
 - 居家照護
 - 社區照護
 - 機構照護
 - 喘息照護
- 預防失智者走失，下列何者為非？
 - 建議帶病患到熱鬧擁擠歡樂的場所，習慣吵鬧的環境
 - 不要讓患者單獨行動，外出需有照顧者同行
 - 讓失智長者穿顏色鮮豔好辨識的衣服，佩戴預防走失手鍊
 - 告知社區鄰居、里長、警員，家有失智長者，請大家多幫忙留意

10. 下列有關褥瘡護理何者為非？
 (A)預防褥瘡應減少組織壓力，照護者應每 2 小時協助病患翻身
 (B)補充蛋白質和維他命有助於傷口復原
 (C)長水泡時，需把水泡搓破掀開再進行傷口照護
 (D)第三級和第四級褥瘡可用手術療法
11. 下列有關鼻胃管照護何者為非？
 (A)灌食前需反抽確定是否有未消化完食物在胃中
 (B)如果完全從鼻胃管進食，不經口進食，就不需做口腔清潔
 (C)灌食過程中，如果病患有不停咳嗽、嘔吐、臉色發青，必須立即停止灌食，將鼻胃管放低，讓胃引流物自然引流出來，密切觀察是否需送醫
 (D)灌食後，需灌入 30~50c.c.溫開水，防止鼻胃管阻塞或食物殘渣留在管壁
12. 內政部老人狀況調查報告中指出，65 歲以上老年人希望的理想居住方式，以下列何者比例最高？
 (A)護理之家或老人安養機構
 (B)獨居
 (C)與子女同住
 (D)與親戚朋友同住
13. 有關失能個案常見的護理問題，何者為是？
 1.跌倒 2.憂鬱 3.大小便失禁 4.頭暈
 (A)1+2+3 (B)1+2+4 (C)1+3+4 (D)2+3+4
14. 下列有關主要照顧者的需求，何者為是？
 1.醫療照護技術支持 2.心理社會支持 3.家務服務 4.請假或放棄工作
 (A)1+2+3 (B)1+2+4 (C)1+3+4 (D)2+3+4
15. 造成失智症最常見的二種病因，何者為是？
 1.阿茲海默氏症 2.額顳葉失智症 3.血管性失智症 4.常壓性水腦症
 (A)1+2 (B)1+3 (C)2+3 (D)1+4
16. 失智症常見的異常精神行為症狀，何者為是？
 1.遊走 2.妄想 3.偷竊行為 4.冷漠
 (A)1+2+3 (B)1+2+4 (C)1+3+4 (D)2+3+4
17. 以下有關自殺者生前就醫的敘述，何者正確？
 (A)自殺者生前曾就醫比例不高
 (B)自殺者生前曾就醫門診類別以精神科為主
 (C)自殺者最後一次就診處以在醫院門診為最多
 (D)自殺通報關懷系統發現國內自殺通報單位僅一成來自醫療院所
18. 以下有關自殺防範的敘述，何者正確？
 (A)絕大多數的自殺事件是可以預防的
 (B)還好自殺事件很少為周遭帶來嚴重的影響
 (C)自殺是老年人的重要死因，排名前三名
 (D)自殺是一個相對單純問題
19. 以下有關自殺危險性評估的敘述，何者正確？
 (A)自殺常常是臨時起意，較少先規劃
 (B)個案有自殺的想法就是高風險
 (C)自殺計畫具體性越高，自殺風險越低
 (D)常常自殺未果的個案屬於高風險
20. 以下有關老年人自殺的敘述，何者正確？
 (A)一般來說老年人自殺致命性比年輕人高
 (B)一般來說老年女性較男性容易用強烈且致命方式
 (C)一般來說老年男性比女性常有自殺意念及企圖
 (D)一般來說老年男性比女性較常以服食過量藥物自殺
21. 以下有關電子煙的敘述，何者正確？
 (A)可以幫助戒菸
 (B)比傳統紙菸安全又不會成癮
 (C)只要不含尼古丁，就不會有危害
 (D)吸電子煙會導致癌症

22. 以下有關菸品危害及戒菸好處的敘述，何者正確？
 (A)減少壽命至少 20 年
 (B)增加罹患糖尿病的機會
 (C)戒菸馬上就能解除危害
 (D)戒菸 15 年者罹患肺癌的風險與未吸菸者相同
23. 以下有關避免產生吸菸念頭的方法，何者正確？
 (A)多喝咖啡提神
 (B)別讓手或嘴閒著
 (C)多休息，不要太忙
 (D)把菸放在顯眼的地方，提醒自己正在戒菸
24. 以下有關精神衛生法之精神醫療照護業務的敘述，何者正確？
 (A)精神醫療機構診治病人或於病人住院時，應向其本人或其保護人說明病情、治療方針、預後情形、住院理由及其應享有之權利等有關事項
 (B)精神照護機構為保護病人安全，經告知病人後，得限制其活動之區域範圍
 (C)精神醫療機構為醫療之目的或為防範緊急暴力意外、自殺或自傷之事件，得拘束病人身體或限制行動自由，得以戒具或其他不正當方式為之
 (D)直轄市、縣(市)主管機關應於轄區內建置四十八小時緊急精神醫療處置機制，協助處理病人護送就醫及緊急安置之醫療事務
25. 以下有關失眠的敘述，何者正確？
 (A)只要是睡不好持續 3 個月以上就是失眠
 (B)大多數失眠者需要接受多頻道睡眠生理檢查，了解原因
 (C)導致失眠開始的事件多是令人憂鬱、焦慮的事件，也可能是令人喜悅的事件
 (D)若有失眠問題，白天盡可能多找休息，如此可以償還睡眠債，改善失眠
26. 以下有關成癮疾病防治的敘述，何者正確？
 (A)屬於身體及心理問題，與社會無關
 (B)屢次復發之海洛英成癮個案最好還是關進監獄
 (C)酒精所佔的失能年數高於非法藥物
 (D)容易形成網路成癮的高危險群包括憂鬱症、焦慮症及高自尊人格
27. 以下何者比較不屬於自殺危險因子？
 (A)早年創傷經驗 (B)缺乏社交活動 (C)容易負面思考 (D)長久失眠問題
28. 以下有關自殺和精神疾病的敘述，何者正確？
 (A)絕大多數的自殺者皆有可以被診斷出來的精神疾病
 (B)以危險性排列，思覺失調症最高
 (C)喝酒容易導致自殺傾向
 (D)憂鬱症目前已經有相當多的治療方式，也很容易被診斷出來
29. 思覺失調症患者在以下情形，會有較高自殺身亡的可能性：
 1.在疾病晚期，當病人處於混亂和/或困惑時 2.在恢復早期，當看起來症狀有所進步但病人內心感到易受傷害時
 3.在復發早期，當病人認為他們本已克服了疾病卻又再復發時 4.出院的短時間內
 (A)1+2+3 (B)1+3+4 (C)2+3+4 (D)1+2+3+4
30. 以下有關戒菸協助，何者正確？
 1.尼古丁成癮度 4 分以上最好要找戒菸門診，可以增加成功率 2.尼古丁成癮度 3 分以下可以找戒菸專線 3.第一次戒菸就失敗，一般再戒就很難成功，所以最好找戒菸門診 4.戒菸後一定會體重暴增，一般至少增加 5 公斤以上
 (A)1+2 (B)1+2+3 (C)1+2+3+4 (D)1+2+4
31. 以下有關拒菸技巧-想吸菸的方法，何者正確？
 1.趕快吃一點高熱量東西 2.拿出菸盒提醒自己不要吸菸 3.告訴自己菸癮很快就會過去 4.運動
 (A)2+3+4 (B)1+3+4 (C)3+4 (D)1+2+3+4
32. 以下有關得強制社區治療之嚴重病人，何者正確？
 1.經專科醫師診斷有接受社區治療之必要，但拒絕接受 2.經指定專科醫師診斷，有施予社區治療之必要，但拒絕接受 3.經指定專科醫師診斷，有施予社區治療之必要，但無法表達 4.雖遵醫囑但其病情不穩或生活功能有退化之虞
 (A)1+2+3+4 (B)2+3+4 (C)1+2+3 (D)1+4
33. 醫護人員之執業執照應向何者申請？
 (A)衛生福利部 (B)考試院 (C)內政部 (D)縣市衛生局

34. 醫師診治病人或檢驗屍體時，發現傳染病或疑似傳染病時，其為第一類或第二類傳染病，應於多久內完成向主管機關通報？
 (A)8 小時內 (B)12 小時內 (C)24 小時內 (D)72 小時內
35. 依醫療法施行細則規定，下列何者不屬於「特殊病床」？
 (A)加護病房之病床 (B)嬰兒床 (C)洗腎治療床 (D)精神科病床
36. 衛生福利部食品藥物管理署係由下列何者於民國 98 年整合而成？
 (A)行政院衛生署食品衛生處、藥政處、中醫藥委員會、管制藥品管理局
 (B)行政院衛生署食品衛生處、藥政處、藥物食品檢驗局、管制藥品管理局
 (C)行政院衛生署藥政處、藥物食品檢驗局、中醫藥管理局、管制藥品管理局
 (D)行政院衛生署食品衛生處、藥政處、藥物食品檢驗局、中醫藥委員會
37. 藥事法所稱「藥事」，係指下列何者？
 (A)藥物、藥商、藥局及其有關事項
 (B)藥師、藥商、藥局及其有關事項
 (C)藥廠、藥師、藥局及其有關事項
 (D)藥品、管制藥品、醫療器材及其有關事項
38. 某藥師執業登記於高雄市甲藥局，應友人之邀於臺南市為產品代言，經臺南市政府衛生局查獲代言虛偽不真實，則下列處置何者正確？
 (A)高雄市藥師公會得將該藥師移付懲戒
 (B)臺南市藥師公會得廢止該藥師公會會員證明
 (C)臺南市政府得廢止該藥師執業執照
 (D)衛生福利部得處該藥師罰鍰處分
39. 有關醫師處方應記明事項及藥劑交付應註明事項等規定，係訂定於下列何項法律中？
 (A)醫療法 (B)醫師法 (C)藥事法 (D)全民健康保險法
40. 依據食品良好衛生規範準則之規定，持有廚師證書的餐飲烹調從業人員應在證書有效期間內，每年接受主管機關或其認可相關機構辦理之衛生講習至少幾小時？
 (A)4 (B)8 (C)12 (D)16
41. 下列何種特性不適宜作為衛生指標菌？
 (A)耐熱性高 (B)營養需求簡單 (C)存在人體腸道中 (D)容易檢測
42. 食品安全性之評估中，有關急性毒性試驗之敘述，下列何者正確？
 (A)測試單一最大劑量餵食之影響
 (B)測試結果無法計算半致死劑量
 (C)以單一性別之動物進行試驗
 (D)犧牲動物前至少需觀察 72 小時
43. 有關過氧化氫在食品上之使用，下列何者正確？
 (A)為我國禁用之防腐劑
 (B)可使用於麵粉及其製品等食品中
 (C)可使用於魚肉煉製品中
 (D)食品中允許殘留量為 0.05%
44. 下列何種微生物污染食品後，以自來水沖洗較能有效防止食物中毒的發生？
 (A)腸炎弧菌 (B)李斯特菌 (C)肉毒桿菌 (D)產氣莢膜桿菌
45. 下列何者屬嚴重藥物不良反應通報辦法所稱之嚴重藥物不良反應？
 1.全身出疹子 2.造成永久性殘疾 3.胎嬰兒先天性畸形 4.死亡
 (A)1+2 (B)1+2+3 (C)1+4 (D)2+3+4
46. 依西藥藥品優良製造規範之規定，為使因交叉污染所引起之嚴重醫療傷害的風險降到最低，哪些藥品應有專用且自足圍堵的生產設施？
 1.青黴素 2.疫苗 3.可待因 4.免疫球蛋白
 (A)1+2+3 (B)1+3+4 (C)1+2+4 (D)2+3+4
47. 社區藥局購買硝甲西洋(Nimetazepam)錠劑調劑時，依法應辦理哪些事項？
 1.申請管制藥品登記證 2.申請管制藥品使用執照 3.依醫師開立之管制藥品專用處方箋調劑 4.應設置簿冊詳實登載收支結存情形
 (A)1+2+3 (B)2+3+4 (C)1+3+4 (D)1+2+4
48. 依全民健康保險法之規定，下列哪些項目不給付？
 1.成藥 2.指示用藥 3.藥癮治療 4.預防接種
 (A)1 (B)2+3 (C)2+3+4 (D)1+2+3+4

49. 請問麻疹的傳染途徑為何？
(A)與禽鳥近距離接觸傳染
(B)經由蚊蟲叮咬傳染
(C)與病人近距離接觸傳染
(D)被動物咬傷傳染
50. 請問有關狂犬病，下列何者錯誤？
(A)依據傳染病防治法，狂犬病為第一類傳染病
(B)人在動物咬傷後，及時接受狂犬病暴露後預防接種，並無法降低發病的風險
(C)我國自 50 年後不再有動物病例，但行政院農業委員會於 102 年 7 月起確認國內野生動物感染狂犬病毒，目前國內疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物
(D)狂犬病由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病後，致死率幾乎達 100%
51. 依據傳染病防治法相關規定，登革熱為第二類法定傳染病，醫療機構及醫師發現疑似病例時，應於多少時間內通報當地衛生主管機關？
(A)24 小時
(B)3 天
(C)1 週
(D)1 個月
52. 腸病毒 A71 型的致病力較高，下列何者並非感染後常出現的症狀？
(A)咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛
(B)發燒時間較長：常超過 3 天，體溫可超過 39°C
(C)容易有中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
(D)幾乎都有手足口症狀：在手部、足部、口腔內等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
53. 請問我國目前麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗的接種時程為何？
(A)出生滿 12 個月時接種一劑，滿 5 歲至入國小前再接種一劑
(B)出生滿 2、4、6 個月各接種一劑
(C)出生滿 15 個月接種一劑，間隔 12 個月再接種一劑
(D)出生滿 6 個月以上，每年接種一劑
54. 請問下列病毒的感染，目前何者尚無疫苗可供使用？
(A)腸病毒 A71 型
(B)人類乳突病毒
(C)狂犬病病毒
(D)日本腦炎病毒
55. 出疹且發燒(耳溫或肛溫)高於 38°C，並具有下列哪一項，即符合麻疹的通報條件？
(A)噁心/嘔吐
(B)有關節炎、關節痛、急性頸部或頭部淋巴腺腫大等症狀之一者
(C)咳嗽、流鼻水或結膜炎(畏光、流淚水或眼睛發紅)三種症狀中的一種
(D)急性肝炎症狀或肝功能異常(ALT \geq 100 IU/L)
56. 我國預防接種受害救濟給付案最多的疫苗為
(A)B 型肝炎疫苗
(B)日本腦炎疫苗
(C)卡介苗
(D)水痘疫苗
57. 請問卡介苗的使用，是為了針對下列哪一種傳染病產生抵抗力？
(A)嚴重急性呼吸道症候群
(B)結核病
(C)茲卡病毒感染症
(D)伊波拉病毒感染
58. 依據我國現行兒童預防接種時程，出生後 24 小時內應儘速接種的疫苗為
(A)B 型肝炎疫苗
(B)卡介苗
(C)白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
(D)13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗

59. 下列我國法定傳染病，在 106 年確定病例人數最多者為何？
(A)登革熱
(B)阿米巴性痢疾
(C)急性病毒性 A 型肝炎
(D)結核病
60. 傳染病防治法之主管機關，在中央為哪一個部會署？
(A)行政院環境保護署
(B)衛生福利部
(C)國家發展委員會
(D)法務部
61. 登革熱的傳染媒介是何種昆蟲？
1. 螞蟻 2. 埃及斑蚊 3. 三斑家蚊 4. 白線斑蚊
(A)1+2 (B)2+3 (C)2+4 (D)3+4
62. 有關中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus [MERS-CoV])，下列哪些敘述是正確的？
1. 中東呼吸症候群冠狀病毒與 2003 年間引發大流行的嚴重急性呼吸道症候群的冠狀病毒 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, SARS-CoV) 基因結構類似
2. 今年曾經在阿曼、沙烏地阿拉伯等國家造成疫情
3. 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus [MERS-CoV]) 為人畜共通傳染病
4. 我國目前國際旅遊疫情建議等級表將沙烏地阿拉伯列為第三級:警告(Warning)，應避免至當地所有非必要旅遊
(A)1+2+3 (B)2+3+4 (C)1+3+4 (D)1+2+4
63. 下列何者為登革熱常見的症狀？
1. 突發發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 2. 頭痛/後眼窩痛/肌肉痛/關節痛/骨頭痛 3. 白血球減少
4. 白血球增加 5. 紅血球減少 6. 紅血球增加
(A)1+2+3+5 (B)1+2+3+6 (C)1+2+5 (D)1+2+3
64. 有關淋病，下列哪些敘述是正確的？
1. 只要接受規律治療，淋病是可以被治癒的，因感染後可產生抗體，故治癒後不會再被感染
2. 淋病主要影響生殖系統，如果沒有及時接受治療，可能會造成不孕
3. 男性感染後 2~7 天會出現症狀，包括：尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感
4. 病患多半是 15~59 歲性活躍期的男性。女性感染的症狀比起男性較不明顯
(A)1+2+3 (B)2+3+4 (C)1+3+4 (D)1+2+4
65. 依人口中推估(2010 至 2065 年)，以下何者為非？
(A)15-64 歲青壯年人口佔比已於 2012 年達最高峰後逐年減少
(B)65 歲以上人口佔總人口比率由 2010 年 11% 至 2017 年增加為 14%，即達到國際慣例所稱的超高齡社會
(C)預估 2040 年老年人口佔比將大於 30%，同時青壯年人口佔比將小於 60%
(D)按照中推估值，台灣人口出生與死亡趨勢圖的交叉點在 2019 年
66. 健康城市的營造，可以遵循以下哪些原則？
(A)強化社區行動 (B)創造支持性環境 (C)建立健康公共政策 (D)以上皆是
67. 在台灣曾發現有西南沿海地區人們的手腳很多皮膚癌和壞疽的情況稱之為烏腳病，至目前為止已有很多研究，以下何者為非？
(A)砷可能不是直接的致癌物，但在很多病例中，很多內臟器官的次發性癌(Secondary Carcinoma)，是由於對砷暴露(包括食入、注射或吸入)引起原發性皮膚癌轉移的結果
(B)在動物身上發現砷會和 DNA 聚合，因而會影響 DNA 的修護
(C)西南沿海地區的烏腳病可能是自來水中含砷而引起
(D)砷能引起角化病，特別是手掌和腳板
68. 下列對於 2025 年衛生政策白皮書的敘述，何者不正確？
(A)主要時代背景是 2013 年衛政與社政組織整併成立衛生福利部
(B)因應社會結構改變、人口老化以及長照需求
(C)建立完善的社會福利支持系統亦是重要方向
(D)重點在研訂各項衛生指標

69. 對於登革熱(Dengue Fever)的敘述，下列何項有誤？
 (A)屬於第二類法定傳染病，必須在 24 小時內通報
 (B)登革熱分四型，出血性登革熱常發生在第二次感染而且是感染不同型
 (C)出血性登革熱會發生在人與人之間傳染
 (D)目前沒有有效的疫苗
70. 關於登革熱快篩結果如下：NS1 Ag(陽性)，IgM(陰性)，IgG(陰性)。你認為此個案如何？
 (A)登革熱初次感染及處於恢復期中
 (B)登革熱再次感染及處於恢復期中
 (C)登革熱初次感染及處於急性期中
 (D)登革熱再次感染及處於急性期中
71. 關於橫斷面研究(Cross-sectional Study)，下列何者為錯？
 (A)可以回答因果關係(Causal Effect)
 (B)包含個人暴露資料
 (C)暴露與疾病時間點之前後關係，難於區分
 (D)是觀察型研究(Observational Study)之一
72. 某研究在 1975 年開始在高雄市收集 3000 人調查其飲酒量，並在 2001 至 2005 年調查此 3000 人癌症發生情形，請問此為何種研究？
 (A)橫斷性研究 (B)病例對照研究 (C)世代研究 (D)實驗性研究
73. 下列有關健康照護體系的敘述，何者不正確？
 (A)健康照護體系主要目標為提升群體健康
 (B)有健康需求的民眾不屬於健康照護體系的重要角色
 (C)健康照護體系的重點工作會隨著社會變遷而調整
 (D)篩檢為健康照護體系中所提供的服務
74. 下列對於地方衛生行政機關的敘述何者不正確？
 (A)涵蓋在衛生福利部的組織架構下
 (B)主要職責在於配合國家衛生政策，推動轄區內各項衛生醫療業務
 (C)在鄉、鎮、區皆設有衛生所，執行基層衛生工作
 (D)在偏遠地區設有衛生室，以提供當地民眾基本的衛生保健及醫療服務
75. 下列何者為社區健康營造的第一步？
 (A)強化社區組織
 (B)找出社區健康議題
 (C)喚起共同參與興趣
 (D)凝聚社區共識
76. 某幼稚園小朋友體重是常態分佈(Normal Distribution)，平均值是 8 公斤，標準差(Standard Deviation)是 2 公斤，則此幼稚園中體重超過 10 公斤的小朋友大約佔有：
 (A)10% (B)95% (C)68% (D)16%
77. 疾病自然史和預防醫學的核心概念的關係，以下何者正確？
 1.疾病自然史包含易感受期(Susceptible Stage)、臨床前期(Pre-clinical or Pre-symptomatic Stage)、臨床期(Clinical Stage)、殘障期(Disable Stage)、死亡(Death)
 2.所以疾病自然史和五級預防完全吻合
 3.初段預防是健康促進和早期診斷
 4.結核病短程直接觀察治療法是最末段預防
 (A)1+4 (B)2+4 (C)1+3 (D)1+3+4
78. 關於台灣新生兒死亡率，以下何者正確？
 1.台灣的新生兒死亡率歷年趨勢是下降的 2.但是因為通報制度在 84 年(1995 年)改變致使看起來是兩段式的下降
 3.新生兒死亡率逐年下降所以扶幼比是逐年上升 4.因此人口數會上升
 (A)1+2+4 (B)1+3+4 (C)2+3 (D)1+2
79. 關於周全性老年評估(Comprehensive Geriatric Assessment)，下列組合何者正確？
 1.可以做鑑別診斷 2.是評估老年病症候群的工具 3.所有 65 歲以上老人都需要做 4.疾病末期者較不需要 5.是訂定整合照護計畫的依據
 (A)1+2+3+5 (B)2+4+5 (C)1+2+4+5 (D)2+3+5
80. 對於肝炎病毒，目前已有疫苗可以施打預防感染的有哪些？
 1.HAV 2.HBV 3.HCV 4.HDV 5.HGV
 (A)1+2 (B)1+2+3 (C)1+2+5 (D)1+2+3+4+5