

預防漢他病毒出血熱 防範鼠患是關鍵




高雄市政府衛生局



漢他病毒出血熱怎麼傳染的？

- ◆ 漢他病毒出血熱是由帶有漢他病毒的老鼠引起



- ◆ 若接觸吸入鼠類分泌物(屎、尿、唾液)
或被咬傷就會受到感染







漢他病毒出血熱的症狀

發燒

血小板減少

急性腎衰竭



防鼠三不政策

不


讓鼠住



居家環境應經常清掃，
減少堆積雜物

不

讓鼠來



封閉居家周圍鼠洞及空隙，
修補破損紗窗及紗門，排水
管加裝柵網防止入侵

不

讓鼠吃



食物、飲水收於封閉容器內，
廚餘加蓋密封與垃圾分離



鼠類辨識



• 屋頂鼠

外觀特徵：毛色不一致、腹部黃褐色，耳大豎立，眼大凸出，鼻部較尖。


棲息地 多在天花板、閣樓等較高處活動



• 家鼷鼠

外觀特徵：體背黃褐色、腹部灰白色、耳大、鼻尖，尾與體長相等。

棲息地 房舍地面上任何隱蔽處櫥櫃、冰箱下、抽屜、儲藏室....



• 溝鼠

外觀特徵：體色為灰棕色，耳朵較短，頭小吻短，後足粗大，尾較短。

棲息地 活動於地面，如庭院內外排水溝中




• 錢鼠 俗稱：臭鼩

外觀特徵：長吻、細眼、又大又多的觸鬚

棲息地 住家、城市排水溝、家畜欄內或近住屋的耕地，以昆蟲為主食，但也吃肉、麵包和垃圾等

漂白水環境消毒如何做？

- ◎ 清理鼠類排泄物要戴口罩及手套
- ◎ 消毒時要開窗，保持通風
- ◎ 清掃完要用稀釋漂白水消毒30分鐘
後再擦掉(100cc市售漂白水+10公升
清水一可標示於水桶上)





如何捕捉家中老鼠？

黏鼠板



捕鼠籠



鼠餌

► 家鼠：南瓜籽、葵花籽



► 溝鼠：香腸、豬皮



► 屋頂鼠：薯片 花生醬






捕鼠及使用鼠餌注意事項？

- 沿著牆壁、牆角或鼠類經常活動的路徑，置放捕鼠籠、黏鼠板或毒餌。
- 放妥捕鼠籠或毒餌後不用經常變動，觀察數日，如無鼠隻前來才更動位置。
- 投放適量的毒餌，待老鼠取食後再補充，以免久置發霉。
- 鼠類可藉由粗糙的牆壁垂直爬行，溝鼠善於游泳，因此，高樓住家門、窗若有破洞則需修補（排水管應加0.6公分網目以下柵網），並注意水溝清潔。





抓到老鼠怎麼辦？



戴口罩、戴塑膠、橡膠手套或使用夾子，
並置入雙層塑膠袋密封，如同一般垃圾清除。

用漂白水消毒可能被鼠污染
的場所並洗手消毒。





高雄市政府衛生局 關心您

